

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 14 mai 2023

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1100°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1100°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>922</b>	905	26-mai	500 m alt. (calculé)	<b>844</b>	813	2-juin
MONTLUCON (231 m)	<b>948</b>	913	24-mai	ÉCHASSIERES (650 m)	<b>809</b>	783	4-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>939</b>	909	25-mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>667</b>	639	21-juin
MONTBEUGNY (270 m)	<b>944</b>	913	25-mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>593</b>	565	24-juin
Gain moyen depuis le 7 mai	<b>97</b>	99		Gain moyen depuis le 7 mai	<b>76</b>	84	

### FOCUS SUR UNE DES EXPLOITATIONS SUIVIES À LUSIGNY

#### Pâturage

- Pâturage tournant : 5 parcelles d'environ 2,5ha (3 prairies multi-espèces et 2 prairies naturelles)
- 24 vaches, 23 veaux et un taureau soit un chargement global de : 50 ares/UGB
- Changement de parcelles tous les 4-5 jours

→ **Débrayage** d'une parcelle de 2,5 ha à compter du 15 mai

#### Fauche

La faucheuse est attelée. Les enrubannages de multi-espèces sont récoltés cette semaine grâce aux 2 jours d'éclaircies annoncées, au stade début-épiaison/épiaison (stade optimum).

### QUELS SEMIS POSSIBLES APRÈS MÉTEIL OU FAUCHE PRÉCOCE ?

#### Fort potentiel de rendement

- **Sorgho fourrager** : 7-8 tMS/ha, possibilité de pâture si hauteur > 70 cm, environ 0,85 UF/kg MS, 9% MAT

- **Maïs précoce** (cycle rapide et moins besoin de degré-jour pour arriver au stade de maturité de la récolte par rapport à un maïs tardif) : 8-10 tMS/ha, environ 0,90 à 0,95 UF/kg MS et 7% MAT

#### Potentiel modéré et forte appétence

- **Moha** : 3-5 tMS/ha, récolte ou pâture, environ 0,7 à 0,85 UF/kg MS et 12-15 % MAT

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Ensilages et enrubannages

➤ Pour les parcelles **déjà récoltées**, un **apport d'azote**, de 30U à 50U peut être une alternative :

- Si une 2<sup>e</sup> coupe est envisagée,
- Si besoin de stocks de fourrages supplémentaires (selon les systèmes, environ 2t de MS /UGB pour l'hivernage),
- Si un pâturage est prévu sur la parcelle et que le chargement est élevé (30-40 ares/UGB).

➤ Pour les parcelles **pas encore récoltées**, saisir la prochaine fenêtre de récolte, tout en sachant que la qualité aura diminué. Si certaines parcelles multi-espèces sont très avancées en stade, une alternative pourrait être de les récolter en foin.

#### Pâturage : La pousse de l'herbe varie de 50 à 90 kg MS/j/ha

La pousse reste constante et au pic cette semaine, prévoir **25 jours d'avance** (cf Info Prairie N°14).

**Si plus de 30 jours d'avance** : débrayer un paddock, revoir la composition des lots (augmenter temporairement le chargement) ou augmenter la hauteur de sortie des paddocks (au maximum 7 cm).

**Si moins de 20 jours d'avance** : intégrer des parcelles fauchées (possibilité de faire pâturer un méteil qui « repique »). Si les fauches n'ont pas encore été réalisées, affourager ou faire tourner plus vite.

Profiter que la faucheuse soit attelée pour **faucher les refus** limitant ainsi la montée à graines des adventices, ils pourront être ingérés par le troupeau une fois séchés au sol.