

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 21 mai 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1100°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1100°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1014	999	26-mai	500 m alt. (calculé)	922	897	2-juin
MONTLUCON (231 m)	1032	1006	25-mai	ÉCHASSIERES (650 m)	884	865	5-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1029	1001	25-mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	733	709	21-juin
MONTBEUGNY (270 m)	1037	1006	24-mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	650	630	25-juin
<i>Gain moyen depuis le 14 mai</i>	90	93		<i>Gain moyen depuis le 14 mai</i>	71	77	

REPOUSSES SUR PT FAUCHÉE LE 2 MAI



- Prairie semée septembre 2022 (RG + TV + Trèfle Incarnat)
- Apport d'N : 50U le 7/3/23 (150°C base 1^{er} fév)
- Fauchée le 02/05 avec un rendement de 5,6 tMS/ha
- Hauteur de fauche 6 cm
- Possibilité de pâturage ou 2^{ème} C

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauches

Avec l'avancée des sommes de température (cf *tableau ci-dessus*), les stades de végétation évoluent rapidement. Si les conditions de portance et météo sont réunies, **prévoir le début des fauches en foin** dès qu'une fenêtre météo se présente (1100 ° Cj atteints cette fin de semaine).

Des foins précoces peuvent être réalisés seulement sur quelques hectares, ou représenter une plus grande proportion des foins. Si les besoins en fibres sont importants (sécurisation de rations), attendre que les fourrages soient plus fibreux (perte de qualité). L'avancée en stade (1-2 semaines) permettra d'avoir plus de tiges.

Attention : **conditions de séchages difficiles avec l'humidité ambiante et les temps orageux** (cf *encadré foins*). De plus les fourrages à ce stade sont encore verts et plus difficiles à faire sécher.

Pâturage : La pousse de l'herbe reste importante : 60 à 100 kg MS/j/ha

➤ Si plus de 30 jours d'avance :

- dernier carat pour débrayer un paddock (ou une partie) : seulement si hauteur d'herbe de 15-20 cm,
- possibilité d'augmenter temporairement le chargement.

➤ **Si moins de 20 jours d'avance** : intégrer des parcelles fauchées entre le 1^{er} et le 8 mai dans le tour de pâturage. Sinon, possibilité d'affourager.

Dans les zones ayant subi les violents orages ce début de semaine, après ressuyage, éviter si possible de faire pâturer les parcelles durant quelques jours : serrer sur une parcelle et affourager.

FOINS : LES CLÉS DU SÉCHAGE ET LA CONSERVATION

- ✓ **Faucher haut** = « hauteur de la main » (prairies : **6 – 7 cm minimum**, si légumineuses : 8 cm) : **le fourrage ne sera pas plaqué au sol** et l'air passera entre le sol et le fourrage → accélère le séchage.
- ✓ **Étaler au maximum le fourrage**
 - faucheuse conditionneuse : faner directement après fauche pour étaler,
 - fauche à plat : le fourrage est directement étalé après fauche.
- ✓ **Ne pas serrer les bottes** au pressage.

Objectif = viser un taux de MS de **85 – 90 %**

- **75 % MS** = foin paraissant sec sauf sous les andains,
- **85 % MS** = foin craquant.

Remarques :

Attendre 7-10 j pour rentrer (si pas de pluie) et stocker les bottes à part. Vérifier la température (< 45 °C).