


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 28 mai 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1400°C _j 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1100°C _j 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1131	1104	12 juin	500 m alt. (calculé)	1031	994	1 ^{er} juin
MONTLUCON (231 m)	1146	1111	11 juin	ÉCHASSIERES (650 m)	990	959	4 juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1143	1104	12 juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	831	793	20 juin
MONTBEUGNY (270 m)	1155	1110	11 juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	745	708	23 juin
<i>Gain moyen depuis le 21 mai</i>	115	104		<i>Gain moyen depuis le 21 mai</i>	103	90	

CROISSANCE DÉCADEAIRE DE L'HERBE (KG MS/HA/J)



2023 : année « particulière » :

- ✓ Démarrage tardif et au ralenti,
- ✓ Explosion et atteinte du pic plus tardivement,
- ✓ Plateau de pousse « maximum » plus long.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauches

Mis à part pour quelques prés plus « tardifs » (encore au stade épiaison), il est maintenant tard pour récolter en ensilage ou enrubbannage (cf graphique ci-contre). Avec le retour des « chaleurs », le cumul de températures grimpe très rapidement (cf tableau ci-dessus) : prévoir les récoltes en foin pour optimiser quantité et qualité.

Remarque : certaines parcelles sont versées, l'herbe blanchie en pied. Faucher plus bas mais cela risque de mettre de la terre dans les bottes, pénaliser les repousses et sera plus difficile à sécher.

Pour les prés fauchés 1^{ère} semaine de mai, prévus d'être pâturés après repousse et si actuellement plus de 25 - 30 j d'avance au pâturage : possibilité de garder 30 à 50 % de la surface pour une éventuelle 2^{ème} coupe.

Pâturage (35 à 65 kg MS/ha/j la semaine dernière) : fin du pic ?


Avec les conditions « poussantes » (cf graphique ci-contre), les refus sont plus importants. Tant que le lot est dans le paddock, faucher les refus pour que les animaux les consomment une fois au sol.

Pour les parcelles qui restent à pâturer et qui sont maintenant avancées en stade : faucher et faire pâturer (« en foin ») dans la foulée peut permettre de faire consommer et d'éviter les refus. Ne pas en faucher trop grand pour faire consommer au fur et à mesure et éviter que ça ne pourrisse au sol avec « l'humidité ».

Broyer les chardons pour limiter leur développement.

Remarque : pour ceux qui ne pourraient plus implanter de maïs : des alternatives existent (cf IP N° 15).

ÉVOLUTION DES SOMMES DE TEMPÉRATURES À PARTIR DU 1^{ER} FÉVRIER (MONTBEUGNY - 270 M)



2023 :

- dans la « moyenne » de ces 13 dernières années (2020 = année précoce et 2013 = année tardive),
- suit la même « tendance » que 2022 (avec seulement quelques jours de retards).