

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 4 juin 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1255	1218	12-juin	500 m alt. (calculé)	1151	1101	19-juin
MONTLUCON (231 m)	1270	1225	11-juin	ÉCHASSIERES (650 m)	1110	1065	22-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1267	1218	11-juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	942	889	8-juil.
MONTBEUGNY (270 m)	1281	1224	10-juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	855	799	11-juil.
Gain moyen depuis le 28 mai	125	114		Gain moyen depuis le 28 mai	116	102	

FOINS : ATTENTION AUX ÉCHAUFFEMENTS

Risque d'échauffement important si la matière sèche est inférieure à **80%** et la **densité des bottes est élevée** (plus de risque avec des presses haute densité). Le risque le plus élevé est entre le **10^{ème} et 30^{ème} jour après le pressage**. Au dessus de **45°C**, il faut surveiller la température des bottes, et laisser sécher quelques jours dehors avant de rentrer.

Méthodes pour détecter un échauffement :

➤ **Sonde de température**

➤ **Barre de cuivre :**

Mettre une barre de cuivre pendant 1h dans une botte : si en sortant elle brûle la main, échauffement.

➤ **Affaissement des bottes**

➤ **Odeur et aspect :**

Température en °C	Couleur	Odeur
45	/	Levain
50	Brun léger	Pomme pourrie
55	Gris	Acide formique
60	Brun	Tabac
65	Brun caramel	Café brûlé
70	Brun noir	Roussi

Source: Chambre d'agriculture des Pyrénées atlantiques

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauches

Avec les fortes chaleurs, les sommes de températures (cf tableau ci-dessus), et donc les stades de végétation, avancent très rapidement : **continuer ou commencer les foins**. L'herbe est pour le moment assez verte, il peut être difficile de bien la faire sécher : risque d'échauffement (cf encadré).

Les 1^{ères} coupes d'enrubannage/ensilage de prairies et méteils doivent être terminées. Pour les méteils pas encore récoltés, attention, une fois en grain, il y a un risque pour la conservation des bottes (rats, ...).

Les 2^{èmes} coupes de légumineuses doivent être réalisées **6 à 7 semaine** après la 1^{ère}. Pour les fauches réalisées fin avril/début mai, prévoir les 2^{èmes} coupes cette semaine ou semaine prochaine, suivant les conditions météo.

Des surfaces supplémentaires en 2^{ème} coupe ? Si le stock sur pied au pâturage est supérieur à 30 jours, il est possible de prévoir en 2^{ème} coupe (20 à 30 %) des surfaces ensilées ou enrubbannées tôt (début mai) et qui devaient être pâturées. Le reste permettra un agrandissement de surface pour le pâturage.

Pâturage : Ralentissement de la pousse

En ce début de période estivale, la pousse d'herbe ralentie (25 à 50 kg MS/ha/j), il faut :

- prévoir **1 mois** de jours d'avance.
- prévoir **60 à 70 ares/UGB** au pâturage.
- sortir les animaux à une hauteur de **5 cm minimum** (« au talon ») et **optimum 7 cm** (« à la cheville »).