


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 11 juin 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1381	1334	500 m alt. (calculé)	1277	1211	18-juin
MONTLUCON (231 m)	1396	1341	ÉCHASSIERES (650 m)	1235	1173	21-juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1393	1336	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1064	989	7-juil.
MONTBEUGNY (270 m)	1407	1340	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	975	893	10-juil.
<i>Gain moyen depuis le 4 juin</i>	126	117	<i>Gain moyen depuis le 4 juin</i>	123	104	

PLUVIOMÉTRIE DE MAI (mm)



Cumul de mai très hétérogène (30 à 160 mm) :

- ✓ principalement des averses orageuses et locales,
- ✓ Lurcy et Montbeugny : 50 à 60 % de déficit.

De janvier à mai : Déficit du cumul des précipitations d'environ 50 mm par rapport à la moyenne 2011-2022 sur le département.

RÉUSSITE DES FOINS DE LÉGUMINEUSES

- Hauteur de coupe **minimum de 7-8 cm**,
 - **Limitier la perte de feuilles (richesse du fourrage se trouve dans les feuilles) :** éviter de faucher, faner, andainer, et presser en pleine chaleur.
- Privilégier le matin ou le soir pour avoir un peu « d'humidité ».

Remarque : Laisser une coupe en fleur pour que les légumineuses reconstituent leurs réserves.

Début floraison = 50% de plante avec un liseré violet

Floraison = 80% des plantes en fleurs.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauches : Fin des foins

Une bonne partie des foins a été réalisée. Jusqu'à présent, les conditions (météo et stades de végétation) ont été favorables pour **les récoltes de qualité en quantité** (à confirmer par des analyses).

Le repère des **1400 ° Cj** (foin tardif) est atteint dans une majorité du département (cf *tableau ci-dessus*). Les foins plus tardifs ou qui ont été déprimés/ététés au printemps ainsi que les 2^{èmes} coupes (cf *encadré*), doivent être récoltés dans la semaine.

Remarque : Attendre davantage pour les foins ne permettra plus de gagner en quantité, mais fera perdre en qualité.

Pâturage : la période estivale commence

Avec les **fortes températures, et les faibles quantités de pluies (voir nulles)** depuis le 15 mai, le manque d'eau commence à se faire ressentir dans certaines zones du département (cf *encadré*) : l'herbe commence à griller sur pied, et donc pourrait rapidement être limitante.

La pousse de l'herbe a ralenti très fortement cette semaine : **25 à 35 kg MS/ha/j**. Les surfaces fauchées la 1^{ère} semaine de mai, donnent de la souplesse pour agrandir le tour de pâturage (chargement de 60 à 70 ares/UGB).

Continuer de faire tourner les lots (4 à 5 parcelles).

Eviter le surpâturage : sortie des animaux à 5 cm (herbe au talon) maximum pour ne pas pénaliser la pousse de l'herbe.

C'est le moment de **faucher ou broyer les chardons** (et refus), avant qu'ils ne soient en fleurs.