


CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 18 juin 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

| Plaine (< 500 m) | | | Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m) | | | |
|------------------------------|------|-------------------|---|------|-------------------|--|
| ANNEE | 2023 | Moyenne 2013-2022 | ANNEE | 2023 | Moyenne 2013-2022 | Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév |
| LURCY-LÉVIS (225 m) | 1507 | 1454 | 500 m alt. (calculé) | 1403 | 1325 | 17-juin |
| MONTLUCON (231 m) | 1522 | 1462 | ÉCHASSIERES (650 m) | 1360 | 1284 | 20-juin |
| VICHY-CHARMEIL (249 m) | 1519 | 1456 | 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) | 1186 | 1093 | 7-juil. |
| MONTBEUGNY (270 m) | 1533 | 1460 | ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) | 1095 | 992 | 8-juil. |
| Gain moyen depuis le 11 juin | 126 | 120 | Gain moyen depuis le 11 juin | 124 | 108 | |

CROISSANCE DÉCADEAIRE DE L'HERBE (KG MS/HA/J)



La croissance de l'herbe a tendance à chuter plus rapidement cette année par rapport à la moyenne des années précédentes.

ABREUVEMENT

Consommation moyenne :

| Vache laitière | Vache allaitante | Brebis | Jument de selle |
|----------------|------------------|-----------|-----------------|
| 70-100 L/j | 50-80 L/j | 10-15 L/j | 45-60 L/j |

Lors de fortes chaleurs, la quantité d'eau nécessaire par animal et par jour peut doubler (+ de 100 L pour les vaches allaitantes par exemple).

Rappel : idéalement, la distance jusqu'au point d'abreuvement ne doit pas excéder 200 m.

Places à l'abreuvoir et volume d'eau (débit ≈30L/min) :

•**Si moins de 200 m** : fournir le quart des besoins quotidiens du lot en 10 minutes et au moins une place d'abreuvoir (60 cm) pour **10 vaches**,

•**Si plus de 200 m** : fournir la moitié des besoins quotidiens du lot en 10 minutes et au moins une place d'abreuvement (60cm) pour **5 vaches**.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : la pousse ralentie

La pousse de l'herbe continue à ralentir sur l'ensemble du département : entre 5 et 20 kg MS/ha/j (cf encadré).

Objectif : Avoir au moins 30 jours d'avance

Si jours d'avance < à 30 :

- **décharger les parcelles** et viser 80 à 100 ares par UGB (chargement d'été) :

- **Augmenter les surfaces** en pâturage : inclure les parcelles de fauche ou faire le choix de faire pâturer une parcelle prévue en 2^{ème} coupe (maximum 15-20 cm de hauteur et préférer les parcelles non épiées ou début épiaison),
- **Baisser le nombre d'animaux** : refaire les lots, sevrer les veaux nés fin d'automne/début hiver, ou bien trier les réformes des vèlages précoces.

- **ou affourager** pour compenser le ralentissement de la pousse.

Rappel : Les animaux doivent disposer de sel, d'eau de qualité à volonté et de zones ombragées au pré. L'accès à l'eau est très important et doit être surveillé, surtout lors de fortes chaleurs (cf encadré).

Foin : dernière ligne droite

La fin des foins approche pour les zones plus tardives du département.