

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### **Pâturage : pousse très faible (5 à 15 kg MS/ha/j)**

**Eviter le surpâturage.** A cette période, cela pénaliserait les repousses qu'il pourrait y avoir suite à des pluies. Ne pas descendre trop bas (pas en dessous de 5 cm).

- Si pousse au ralenti : continuer de faire tourner en surveillant la hauteur de sortie,
- Si pas assez de stock sur pieds (-15j d'avance) : affourager en serrant les animaux sur une parcelle avec ombre et point d'eau. Cela évitera de pénaliser les autres parcelles. Mieux vaut en « sacrifier » une que de « tout ouvrir ».

*Indicateurs : les plantes à rosettes sont souvent présentes quand les prairies sont surpâturées (pissenlits, pâquerettes, porcelles...).*

#### **Bilan de stocks et alternatives : 2<sup>ndes</sup> coupes ? Dérobées ?**

En raison de la faible pousse, les prairies destinées à des 2<sup>ndes</sup> coupes ne sont pas toujours très développées. Si suffisamment de stocks pour l'hiver, les faire pâturer :

- agrandir la surface pour les lots mères-veaux ou génisses,
- possibilité de faire pâturer un lot de vaches, génisses ou bœufs à l'engrais (laisser de la fibre à disposition). *Rappel : si + de 2 kg de concentrés, distribuer en 2 repas.*

Si les stocks semblent insuffisants, possibilité d'implanter des dérobées pour fauche ou pâture (colza, moha...) après les moissons (travail du sol préconisé pour décompaction et destruction des chaumes).

### QUI SUIS-JE ?

- Espèce pérenne de la famille des Composées
- Plutôt dans les milieux secs
- Rosette plaquée au sol
- Tige sans feuilles portant plusieurs capitules
- Fleurs jaunes (ressemble au pissenlit)



En pleine floraison actuellement,  
**je peux abonder dans les prairies surpâturées.**

Je suis la **PORCELLE ENRACINÉE**

**→ Eviter le surpâturage, diminuer le chargement, augmenter le temps de repos surtout en période de sécheresse.**

Attention : toxique pour le cheval, provoque l'apparition d'une affection de l'appareil locomoteur (harpeur australien).