

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 24 mars 2024

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 700°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	483	363	13-avr.	500 m alt. (calculé)	423	320	1-avr.
MONTLUCON (231 m)	481	376	13-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	400	305	4-avr.
VICHY-CHARMEIL (249 m)	482	368	13-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	326	229	15-avr.
MONTBEUGNY (270 m)	478	368	13-avr.	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	281	198	25-avr.
<i>Gain moyen depuis le 17 mars</i>	86	55		<i>Gain moyen depuis le 17 mars</i>	73	42	

CONSEILS DE LA SEMAINE

Continuer la mise à l'herbe progressive en adaptant le chargement

- Prairie précoce et portance convenable : si hauteur d'herbe > 8 -10 cm, charger à 40 à 50 a/UGB, si hauteur < 8 cm, charger à 50 à 60 a/UGB,
- Prairie plus tardive ou encore humide, charger à 60 à 80 a/UGB.

STOP Déprimage

Les **500°Cj base 1^{er} fév (=stade épi 5 cm)** sont atteints dans la majorité du département. Pour ne pas pénaliser les quantités, le déprimage doit se **terminer** (cf. encadré).

- Si report de stocks suffisants → accepter de faire de l'évétage au détriment de la quantité (seulement 1/3 des surfaces en foin).
- Si report de stocks limités → sortir les animaux des parcelles prévues en fauches.

Fertilisation des parcelles en foin (entre les 350 et 450°Cj base 1^{er} fév)

Pour être optimisés, les **apports d'engrais** sur les prairies destinées à être fauchées en foin doivent se terminer.

Apporter entre **30 U d'N/ha et 50 U d'N/ha**.

DÉPRIMAGE OU ÉTÊTAGE ?

Plusieurs intérêts à ces pratiques

- Avoir des fourrages de meilleure qualité,
- Moins charger certains près au début de mise à l'herbe (peu de portance ou limite en herbe),
- Mise à l'herbe plus tôt.

Quelle différence ?

Le moment de sortir les animaux de la parcelle.

➤ De la qualité sans pénaliser les quantités :

Ne pas faire consommer l'épi dans la gaine = sortir les animaux **avant le stade « épi 5 cm »** (= 500°Cj base 1^{er} février).

→ c'est le **DÉPRIMAGE**.

➤ Privilégier la qualité au dépend de la quantité :

L'épi est consommé dans la gaine : les repousses sont « feuillues », de qualité **mais les rendements diminuent**.

→ c'est l'**ÉTÊTAGE**.

