

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 31 mars 2024

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 700°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 700°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	548	431	14-avr.	500 m alt. (calculé)	481	382	21-avr.
MONTLUCON (231 m)	543	443	14-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	454	365	26-avr.
VICHY-CHARMEIL (249 m)	552	436	13-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	373	278	7-mai
MONTBEUGNY (270 m)	543	438	14-avr.	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	320	243	19-mai
Gain moyen depuis le 24 mars	66	65		Gain moyen depuis le 24 mars	51	53	

SUIVI DE PRAIRIES

8 exploitations suivies (6 BV et 2 BV+OvV)

- 3 Bocage Nord,
- 3 Bocage Sud,
- 1 Sologne,
- 1 Montagne Bourbonnaise.

Le suivi hebdomadaire de **parcelles pâturées** (pâturage tournant) ou **fauchées** (récolte précoce ou tardive) permet de :

- Calculer la **pousse de l'herbe** (mesures de hauteurs d'herbe),
- Observer les **stades de développement des graminées**,
- Observer les **plantes bioindicatrices**.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage

Sur les parcelles suivies, les pousses d'herbes sont de l'ordre de **20 à 60 kg MS/ha/j**.

▪ Adapter le chargement

- Sur les prairies portantes, tendre vers le chargement de printemps de 40-50 a/UGB,
- Sur prairies plus tardives ou encore « humides », garder un chargement de 50-70 a/UGB,
- Sur prairies moins portantes en raison des pluies du week-end, garder + de 70 a/UGB.

▪ Finir le 1^{er} tour de pâturage avant les 650°C-700°C (base 1^{er} fév)

L'objectif est de finir le premier tour avant épiaison afin que l'épi soit mangé et disposer de **repousses feuillues** de qualité et en quantité pour les cycles suivants. Compte tenu de l'avance en herbe dans certains prés, même s'il reste encore de l'herbe à pâturer, préférer changer les animaux de parcelles pour finir le premier tour à temps.

Attention, ce repère devrait être atteint dans 10-15 jours.

Pour rappel : ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm (pénalise les repousses).

Fauche

Avec l'avancée des sommes de températures (cf. graphique), les prairies très précoces (RGI, RGH ...) évoluent vite. Si les conditions de portance s'améliorent, les fauches devraient débuter d'ici le 20-25 avril.

2024 : UNE ANNÉE PRÉCOCE !

Évolution des sommes de température Base 1^{er} fév (Montbeugny 270 m)

