



INFO-PRAIRIE Allier

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural ALIMENTAIRE LANGE LA REPOSSE LA REP

Programme
Régional
Autonomie
Fourragère

Réseau pousse d'herbe - **Bulletin n°10** - Semaine 15

	•	
CUMUL DES TEMPE		
		'47 A () / A () 2(1/24)
CONTEL DED TENTE	HILL CHES ELL SECTION	

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)				
ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 70 0°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 70 0°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	651	498	11 avril	500 m alt. (calculé)	577	439	18 avril
MONTLUCON (231 m)	647	508	11 avril	ÉCHASSIERES (650 m)	545	420	22 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	656	501	10 avril	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	459	323	3 mai
MONTBEUGNY (270 m)	646	504	11 avril	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	399	282	15 mai
Gain moyen depuis le 31 mars	103	65		Gain moyen depuis le 31 mars	89	50	



Bilan hydrique (oct à mars) : + 30 à 40 %

Cumul des trois 1ers mois de l'année : + 40 à 50 %

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauches précoces : viser le stade début épiaison – épiaison (= 750°Cj base 1er février)

Pour optimiser quantité et qualité, les fauches précoces seront à prévoir autour du 20 - 25 avril (fonction de la portance et d'une fenêtre météo suffisante pour les récoltes).

Pâturage : mise à l'herbe et organisation compliquées

- > Adapter le chargement à la portance (cf. IP 9).
- > Faire pâturer en priorité les parcelles les plus avancées (en stade et hauteur d'herbe).
- Si la mise à l'herbe a tout juste débuté ou n'est pas commencée et si sur plus de 2/3 des surfaces à pâturer l'herbe dépasse « la mi-botte »
 (= 12 à 14 cm à l'herbomètre) → « débrayer » si possible une parcelle du cycle de pâturage.

Plusieurs alternatives envisageables:

- si mécanisable, envisager une parcelle (ou une partie) pour de la fauche précoce ;
- diviser le lot initial en 2 et faire pâturer sur 2 parcelles distinctes (fonction des points d'eau, de la gestion de la reproduction,...);
- faire passer un autre lot en complément (même si initialement pas prévu à pâturer ces parcelles) ;
- lâcher tout le lot en ouvrant temporairement 2 parcelles contiguës (diminuera le chargement instantané).
- ➤ Si la portance est « satisfaisante » : continuer de faire tourner les lots et accélérer au besoin le changement de parcelles → permettra de descendre moins bas, de moins piétiner et de moins « souiller » certaines zones.

Fin du 1er tour de pâturage prévu au 15 - 20 avril