

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 21 avril 2024

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 900°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 900°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>806</b>	654	29-avr.	500 m alt. (calculé)	<b>710</b>	584	7-mai
MONTLUCON (231 m)	<b>786</b>	663	30-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	<b>677</b>	565	11-mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>810</b>	656	28-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>570</b>	443	22-mai
MONTBEUGNY (270 m)	<b>801</b>	664	29-avr.	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>499</b>	396	2-juin
<i>Gain moyen depuis le 14 avril</i>	<b>60</b>	80		<i>Gain moyen depuis le 14 avril</i>	<b>41</b>	68	


### RÉUSSITE DES FAUCHES PRÉCOCES

- ✓ Récolter au stade **début épiaison** (700-750°Cj prairies précoces)
- Meilleur compromis **qualité - quantité**.
- ✓ **Ne pas faucher trop bas : 6-7 cm maximum (7-8 cm pour les légumineuses)** (trop bas : risque de mélange avec terre + démarrage difficile après fauche ; plus haut : séchage facilité).
- ✓ Viser un taux de MS de :
  - **30 - 35 %** pour les **ensilages**,
  - **50 - 60 %** pour les **enrubannages**.
- ✓ **Conservation :**
  - **Tassage** : important pour chasser l'air (étaler des couches de 10-30 cm),
  - **Pressage** dense et uniforme, manipuler le moins possible les bottes.

### 2024 ANNÉE PRÉCOCE

= ANNÉE MOYENNE DE DEMAIN

Evolution de la date de fauche précoce (750°Cj base 1<sup>er</sup> fév) entre 2000 et 2050



Source : SIDAM-AP3C V.CAILLIEZ 2023

D'après l'étude AP3C, en 2050, dans l'Allier, le jour d'atteinte des 750°C sera avancé en moyenne de 11 à 17 jours par rapport à 2000.

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Fauches précoces : 1<sup>ères</sup> récoltes réalisées la semaine passée

Prendre la prochaine fenêtre de tir pour récolter des fourrages de qualité en quantité. Avec de l'herbe jeune et les conditions humides, accorder une attention particulière aux conditions de séchage et hauteur de coupe (cf. encadré).

#### Pâturage : pousse actuelle de 10 à 50 kg MS/ha/j

Le froid de ces derniers jours ralentit la pousse. Attention : avec le froid matinal : bien penser à laisser de la fibre à disposition. Le premier tour de pâturage doit être terminé. Continuer les rotations et recommencer un cycle.

Si le premier tour n'est pas fini, et/ou + de 25 j d'avance :  
→ **Débrayage d'une parcelle nécessaire** (cf. IP 11 pour les jours d'avance).  
C'est le moment de le faire : faucher en même temps que les fauches précoces !  
→ Si impossibilité de faucher, faire passer un autre lot. Sortir les animaux plus vite d'une parcelle pour avancer dans la rotation.

*Pour les élevages mixtes : faire passer également d'autres animaux : moutons (si clôtures adéquates), chevaux... Les espèces vont se compléter dans les hauteurs et les plantes pâturées. Il est possible de faire pâturer différentes espèces en même temps ou bien successivement.*