

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 19 mai 2024

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2024	Moyenne 2014-2023	Prévision date 1100°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	1158	1014	3 juin	500 m alt. (calculé)	1025	912	23 mai
MONTLUCON (231 m)	1141	1021	4 juin	ÉCHASSIERES (650 m)	975	882	28 mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1158	1020	3 juin	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	832	721	7 juin
MONTBEUGNY (270 m)	1149	1025	3 juin	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	731	644	17 juin
<i>Gain moyen depuis le 12 mai</i>	97	91		<i>Gain moyen depuis le 12 mai</i>	81	76	

FOCUS SUR UNE DES EXPLOITATIONS SUIVIES

(SECTEUR BOCAGE NORD, BV + OV, 1,2 UGB / HA)

- ✓ **Enrubannage :**
22 avril → 4,5 t MS/ha sur 17,8 ha T-RG.
08 mai → 3,7 t MS/ha sur 35,7 ha T-RG.
→ 6,9 t MS/ha sur 7,1 ha méteil.
51,9 ha prévus en 2^{ème} coupe et 8,7 ha en maïs.
- ✓ **Pâturage :**
Mise à l'herbe : à partir du 8 avril.
2^{ème} tour en cours.
5 lots de vaches suitées :
- 2 à 4 parcelles au printemps,
- 40 à 43 ares / UGB,
- 7 à 10 jours / parcelles.

CONSEILS DE LA SEMAINE

FAUCHE

Les conditions (volumes de fourrages importants, créneaux de récolte restreints, « humidité » dans l'air et temps bas) sont peu favorables à la **bonne conservation** des fourrages :

- ⇒ faucher haut : **7 – 8 cm** pour faciliter le passage d'air sous les andains et éviter de plaquer le fourrage au sol,
- ⇒ objectif de MS : **30 – 35 % MS** pour les ensilages et **55 – 60 % MS** pour les enrubbannages (cf. encadré),
- ⇒ enrubbannage : stocker des bottes sur une seule hauteur maximum,
- ⇒ ajouter si besoin un conservateur (sel) en cas de récolte en conditions « extrêmes ».

Pour les méteils dont le stade de la céréale est trop avancé :

- faucher dès que possible et récolter plutôt en enrubbannage : doubler le nombre de tours de film, ne pas enrubanner au champ et prévoir de distribuer rapidement car risque d'attaque par les rongeurs,
- ou attendre que le grain soit mature et moissonner.

PÂTURAGE : pousse de 20 à 40 kg MS/ha/j

Si moins de 10 jours d'avance :

- ouvrir un pré prévu à la fauche, ou une partie (si possible les moins avancés en stade),
- ou faire pâturer les prés fauchés fin avril – début mai,
- ou serrer sur une parcelle portante et affourager.

Remarque : pour les prés peu portants, laisser ouverts plusieurs prés en même temps (limite le chargement).

VÉRIFIER LE TAUX DE MS AVANT RÉCOLTE ?

En andain :	% de MS atteint :
En tordant une poignée à la main, les doigts s'humidifient de quelques gouttes	30 % MS
En tordant une poignée à la main les doigts s'humidifient sans goutte	35 % MS
En tordant les feuilles, pas d'humidité sur les doigts	40 % MS
Le fourrage est souple mais devient mat comme du foin	50 % MS
Certaines feuilles sont cassantes	65 % MS