

CONSEILS DE LA SEMAINE

Si d'une année à l'autre les campagnes fourragères sont toujours rythmées par la succession des mêmes interventions, anticiper les différentes étapes du calendrier fourrager permettra de mieux s'organiser et s'adapter au contexte climatique de l'année.

→ Suivre la correspondance entre **stades de développement** des principales graminées et **sommes de températures** (cf ci-contre) permettra d'**ajuster** ses pratiques afin d'**optimiser** quantité et qualité de l'herbe fauchée et pâturée.

Prochain repère

Apports d'azote à prévoir dans les 10-15 jours après les 200 °Cj (base 1^{er} janvier).


Sommes de températures (base 1^{er} janvier) : où en est-on ?

| Sommes de températures au 04/02/24 base 1 ^{er} janvier (° Cj) | Vichy | Echassières | Lurcy-Lévis | Montbeugny | Montluçon |
|---|-------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | 200 | 174 | 193 | 185 | 198 |

Date N°PRAIRIE = Un outil ARVALIS Institut du Végétal, disponible en ligne, pour suivre l'évolution des sommes de températures à partir du 1^{er} janvier.

A retrouver sur : <http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr/index.php>

PRINCIPALES INTERVENTIONS DU CALENDRIER FOURRAGER, SOMMES DE TEMPÉRATURES ET STADES DE DÉVELOPPEMENT



Prairie permanente

Le Theil 5/02/24

Pâturée jusqu'en décembre.
Hauteur de sortie avant hiver inférieure à 5-6 cm, ce qui retardera le redémarrage.

ÉTAT DES PRAIRIES

→ Les conditions météo de ces dernières semaines (gel et neige) ont été favorables à un repos végétatif des prairies, nécessaire pour le redémarrage.